

Mögliche Pflanzenschutzstrategie 2020⁵⁾




Martin Keller, Sonderkulturberatung in
Zusammenarbeit mit
Franco Weibel, Ebenrain

Kirschen IP



Stadium	Produkte ⁵⁾ Aufwandmenge beruht auf 10'000m ³ /ha + = Tankmischung möglich	kg/lt/ha	Wartefrist	GWA-auflagen	Bakterienbrand	Schrotschuss	Monilia (Bl.+Zw.)	Fruchtmonilia	Sprühflecken	Bitterfäule	Kirschblütenmotte	Frostspanner	Schalenwickler	Blattläuse	Kirschenfliege	KEF	Kirschkernstecher	Wanzen	Gem. Spinnmilben	Rote Spinnmilben	Trips	Bemerkungen	Datum
 00	Kupferhydroxid (Bsp. Cuprum Flow) ¹⁾ Weissöl S	800gr. Rein-Cu 32lt			x						(x)	(x)	(x)						(x)	x		ab 12 Grad C; auch im Stadium 51 möglich; nicht gegen Kommaschildlaus; 1000-1600 L Wasser je nach Baumvolumen	
 51	Dithianon (Bsp. Delan WG) ²⁾ + Netzschwefel (Bsp. Kumulus) ⁴⁾ Rebell Rosso + Köderflüssigkeit	0,5kg 4kg		50m		x x			x x	x x									(x) (x)	(x) (x)		x Ungleicher Holzbohrer	
53-56	Falls anhaltende Infektiöse Witterung Dithianon (Bsp. Delan WG) + Netzschwefel (Bsp. Kumulus)	0,5kg 4kg		50m		x x			x x	x x									(x) (x)	(x) (x)			
 57	Dithianon (Bsp. Delan WG) ²⁾ + Netzschwefel (Bsp. Kumulus)	0,5kg 4kg		50m		x x			x x	x x									(x) (x)	(x) (x)			
 59	Folpet Produkt + Netzschwefel (Bsp. Kumulus WG) + Mimic Aufbrauchfrist 31.07.2021 oder 1. Behandlung Capex 2	2kg 4kg 0,8lt 100ml		20m	x	x			x x	x x		x	x	(x)					(x) (x)	(x) (x)		Mimic nicht in offene Blüte spritzen (Bientox) Alternative Steward	

Stadium	Produkte	Kg/lt/ha	Wartefrist	GWA-auflagen	Bakterienbrand	Schrotschuss	Monilia (Bl.+ Zw.)	Fruchtmonilia	Sprühflecken	Bitterfäule	Kirschblütenmotte	Frostspanner	Schalenwickler	Blattläuse	Kirschenfliege	KEF	Kirschkernstecher	Wanzen	Gem. Spinnmilben	Rote Spinnmilben	Trips	Bemerkungen	Datum
 61	Cercobin ³ + Folpet Produkt Verwirrung Schalenwickler CLR/OFM	2lt 2kg		50m 20m		x	x	x	x													700Stk./ha	
 65	Difenoconazole (SSH, Bsp. Slick) ³⁾ + Folpet Produkt	0,32lt 2kg		20m 20m		x	x	x	x													Weil Cercobin nur 2x erlaubt mit SSH (Bsp. Slick) abwechseln	
 67	Folpet Produkt + Cercobin	2kg 2lt		20m 50m		x	x	x	x														
 69	Dithianon (Bsp. Delan WG) ²⁾ + Netzschwefel Bsp. Kumulus WG) + wenn nötig ☒ Pirimor (mind.18°C!) Neem Aza ⁵⁾⁶⁾ oder Splitbehandlung 2x2,4lt mit 10 Tagen Abstand	0,5kg 4kg 0,64kg 4,8lt		50m 50m		x x			x x					x x					(x) (x)			Evtl. Neem-Strategie zur Rückstandsvermeidung (siehe Bio) oder ☒ Teppeki	
 73	Folpet Produkt + ☒ Trifloxistrobin (Bsp. Flint) ³ + wenn nötig Capex 2 (Andermatt) Für Nachbeh. Frostspanner Delfin (0,8kg/ha verwenden)	2kg 0,4kg 100ml		20m		x x	x x	x x	x x				x									Weil vorgelegt mit Mimic; sonst 1 Capex-Beh. Stad. 59	
 75	☒ Folpet Produkt Rebell Amarillo KiFli-Fallen Insektennetze schliessen Drosophila Fallen	4kg		20m		x			x	x												Reserve je nach Witterung Überwachung Kirschenfliege Ausschluss KiFli und KEF KEF-Überwachung innen und aussen	

Stadium	Produkte	Kg/lit/ha	Wartefrist	GWA-auflagen	Bakterienbrand	Schrotschuss	Monilia (Bl.+ Zw.)	Fruchtmolmilia	Sprühflecken	Bitterfäule	Kirschblütenmotte	Frostspanner	Schalenwickler	Blattläuse	Kirschenfliege	KEF	Kirschkernstecher	Wanzen	Gem. Spinnmilben	Rote Spinnmilben	Trips	Bemerkungen	Datum
 77	☒ Moon Privilege + ☒ Trifloxistrobin (Bsp. Flint) ³ + ☒ Gazelle SG	0,28lt 0,28kg 0,32kg	2Wo 2Wo 2Wo	20m		x	x (x)		x x						x x							Entspricht Moon-Sensation Alternativ Alanto; nicht während Saison wechseln (Anz. Rückstände). KEF-Fallen und Einstiche wöchentlich kontrollieren	
 85	☒ Moon Privilege + ☒ Trifloxistrobin (Bsp. Flint) ³ + ☒ Gazelle SG Nekagard oder Neem Azal ⁹⁾¹⁰⁾	0,28lt 0,28kg 0,32kg 2kg 4lt	2Wo 2Wo 2Wo 2Wo 2Wo	20m		x	x (x)		x x					x X x	X x (x)							Nicht auf offene Blüten (Bientox) Alle 7-10 Tage bis zur Ernte	
 87	Nekagard (Repellentium) ☒ Audienz ⁶⁾ bei nachgewiesenem Druck	2kg 0,2lt	 7T.	20m											(x) x							Vorsicht Spritzflecken (sind abwaschbar Am Abend applizieren (UV-empfindlich und Bientox) Allgemeinverfügung beachten	
Nachernte 93	Dithianon (Bsp. Delan WG) ²⁾ Blattdüngung gemäss Nährstoffplan	0,8kg	50 m			x		x	x													N-Blattdünger müssen in Swiss-Bilanz	
Bei Blattfall 98	Bodeauxbrühe oder Myko-Sin oder Nekagard + Cuprum-Flow 720gr.Rein-Cu	8kg 8kg+2l			x																	Pseudomonas	

☐ = Fungizid ☐ = Insektizid ☐ = Biocontrol ☐ = Blattdünger gemäss separatem Nährstoffplan

1) Maximal 4kg Reinkupfer/Jahr

- (x) = Teilwirkung; ☒ verursacht so angewendet wahrscheinlich Rückstandsnachweis > 0.01 ppm

2) Dithianon (Delan) max. 1680 g/ha,J im Steinobst das heisst: 5 x 0.48kg Delan + 2 kg Schwefel oder 3 x 0.8kg Delan pro Jahr

3) Erlaubt pro Jahr: SSH 4x, Cercobin 2x, Strobilurine 3x, SDHI 3x

7) Aufbrauchfrist 2020 FlintC bis 31.10.2020

4) Schwefel nach der Blüte; bis 15°C 4kg und mehr, bis 25°C 2kg, ab 25°C 1kg

8) Folpet, Captan ca.7 Wo. nachweisbar

5) Stand Bewilligungen und Auflagen des BLW vom 18.12.2019/ SAIO 2020

9) Max 3 Beh. /Jahr

6) Bezüglich Kirschesigfliegenbekämpfung aktuelle Allgemeinverfügung beachten

10 Neem Azal; Nach Niederschlag 24h Wachsschicht aufbauen lassen, gute Benetzung 700-1'000lt/ha, nicht in direkte Sonneinstrahlung (Linseneffekt) (Abend)